



INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

SSC - CGL

Prelims & Mains

STAFF SELECTION COMMISSION



भाग - 4

गणित (संख्यात्मक अभियोग्यता)

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “SSC CGL (COMBINED GRADUATE LEVEL)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “SSC CGL (COMBINED GRADUATE LEVEL)” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशक:

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/we22vv>

Online Order करें - <https://shorturl.at/tD0Y8>

मूल्य :

संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
<u>गणित (संख्यात्मक अभियोग्यता)</u>		
1.	संख्या प्रणाली	1
2.	इकाई अंक और भाजकता	6
3.	लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक	29
4.	भिन्न एवं दशमलव	38
5.	सरलीकरण	41
6.	अनुक्रम और श्रृंखला	51
7.	बीजगणित	59
8.	अनुपात-समानुपात	87
9.	प्रतिशतता	94
10.	लाभ और हानि	108
11.	औसत	119
12.	साझा	127
13.	मिश्रण	136
14.	साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज	144
15.	चाल, समय और दूरी	161
16.	कार्य और समय	168
17.	क्षेत्रमिति	178
18.	व्यामिति	201
19.	त्रिकोणमिति	215

20.	डाटा इन्टरप्रिटेशन	229
21.	सांख्यिकी	252
22.	प्रायिकता	269



अध्याय - 3

लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य


L.C.M. होता क्या है ?

वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए वही संख्या दी हुई संख्याओं का L.C.M. कहलाती है।

हम लोग गुणनखण्ड विधि और भाग विधि से L.C.M. निकालना जानते हैं। तो आइए L.C.M. निकालने के कुछ शॉर्ट तरीकों को देखते हैं।

जैसे - 10, 12, 15 का ल.स. कितना होगा ?

अब हम वह छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जो 10, 12, 15 से कट जाए।



60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 10, 12, 15 से कट जाएगी। अतः 60 ही हमारा L.C.M. है।

या

आप दी संख्याओं 10, 12, 15 में से सबसे बड़ी संख्या लिखें और सोचो कि उसमें किस संख्या से गुणा कर दें ताकि शेष बची संख्याओं से कट जाए, वही संख्या जिसका हमने गुणा किया है वो ही L.C.M. है जैसे-

$$\frac{15 \times 4}{10, 12}$$

अगर हम 15 में 4 का गुणा कर दें तो गुणनफल 60 आएगा जो 10, 12 से कट जाएगा।

भाग विधि -

2	10, 15, 20
2	5, 15, 10
3	5, 15, 5
5	5, 5, 5
	1, 1, 1

$$LCM = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$$

गुणनखण्ड विधि -

$$10 = 2 \times 5$$

$$15 = 3 \times 5$$

$$20 = 2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 5$$

$$LCM = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$$

Note : अधिकतम संख्या तथा बड़ी से बड़ी घात ही LCM होता है।

महत्तम समापवर्त्य (H.C.F.) (म.स.) :- वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती हो

| अथवा वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएँ पूर्णतः विभाजित हो म.स. कहलाता है।

उदाहरण- 15, 20 व 30 का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो ?

(i) भाग विधि -

$$\begin{array}{r} 5 \overline{)20} \quad (4 \\ 20 \\ \hline x \\ 5 \overline{)15} \quad 3 \\ 15 \\ \hline x \end{array}$$

अतः H.C.F. = 5 होगा

या

$$\begin{array}{r} 3 \overline{)15} \quad 2 \overline{)20} \quad 2 \overline{)30} \\ 5 \quad 5 \quad 2 \quad 10 \quad 3 \quad 15 \\ \hline 1 \quad 5 \quad 5 \quad 5 \quad 5 \\ \hline 1 \quad 1 \end{array}$$

$$15 = 3 \times 5$$

$$20 = 2^2 \times 5$$

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

अतः 15, 20, 30 का H.C.F. = 5 होगा।

(ii) उभयनिष्ठ (Common) संख्या तथा छोटी से छोटी घात (HCF) म.स. कहलाती है।

Note :- किसी भी संख्या में उसका HCF मौजूद होता है जबकि संख्या खुद LCM में छिपी होती है। अतः सभी संख्याओं का LCM उनके HCF से पूर्णतः विभाजित होता है।

दशमलव संख्याओं का LCM तथा HCF :- दशमलव संख्याओं का LCM तथा HCF ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्याओं में दशमलव को नजरअंदाज करते हुए LCM तथा HCF निकाल लेते हैं।

Example :-

1. 0.036, 4.8 व 0.15 का LCM ज्ञात करो ?

$$\text{हल - } \frac{36}{1000}, \frac{4800}{1000}, \frac{150}{1000}$$

$$36, 4800, 150 \text{ का LCM} = 14400$$

$$0.036, 4.8, 0.15 \text{ का LCM} = \frac{14400}{1000}$$

$$LCM = 14.4$$

2. 0.20, 12 व 0.032 का HCF ज्ञात करो ?

$$\text{हल - } \frac{200}{1000}, \frac{12000}{1000}, \frac{32}{1000}$$

$$200, 12000, 32 \text{ का HCF} = 8$$

अतः 0.20, 12 व 0.032 का HCF = $\frac{8}{1000} = 0.008$

भिन्नो का ल.स. एवं म.स. -

$$\text{भिन्नो का LCM} = \frac{\text{अंशों का LCM}}{\text{हरों का HCF}}$$

$$\text{भिन्नो का HCF} = \frac{\text{अंशों का HCF}}{\text{हरों का LCM}}$$

अक्षरों का LCM तथा HCF - अधिकतम अक्षर तथा उनपर लगी बड़ी से बड़ी घात LCM होता है व उभयनिष्ठ(Common) अक्षर तथा उनपर लगी छोटी से छोटी घात उन संख्याओं का HCF होता है।

Example:-

A. $a^3b^5c^8, b^{15}c^5d^4$ का LCM तथा HCF ज्ञात करो ?

हल- यहाँ दिए गए अक्षर a, b, c, d हैं तथा इन पर बड़ी से बड़ी घात = a^3, b^{15}, c^8, d^4 हैं जो LCM होगा।

यहाँ दिए अक्षर a, b, c, d में Common अक्षर b व c पर सबसे छोटी घात वाला अक्षर b^5c^5 है जो HCF होगा।

अंक तथा अक्षरों का ल.स. तथा म.स. - जब अक्षर व अंक एक साथ दिए गए हो तो अंकों का व अक्षरों का अलग-अलग LCM व HCF ज्ञात करके प्रश्न को हल करते हैं।

Example :-

1. $8a^4b^8, 12a^2b^{12}c^{10}, 18a^7b^4c^3d^5$ का LCM व HCF ज्ञात करो ?

हल- 8, 12, 18 का ल.स.

2	8, 12, 18
2	4, 6, 9
2	2, 3, 9
3	1, 3, 9
3	1, 1, 3
	1, 1, 1

$$\text{ल.स.} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 72$$

$$a^4b^8, a^2b^{12}c^{10}, a^7b^4c^3d^5 \text{ का LCM} = a^7b^{12}c^{10}d^5$$

$$\therefore \text{LCM} = 72 a^7b^{12}c^{10}d^5$$

HCF के लिए -

2	8	2	12	2	18
2	4	2	6	3	9
2	2	3	3	3	3
	1		1		1

$$8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$$

$$12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$$

$$18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$$

$$\text{HCF} = 2 \text{ (संख्याओं का म.स.)}$$

$$a^4b^8, a^2b^{12}c^{10}, a^7b^4c^3d^5 \text{ अक्षरों का HCF} = a^2b^4$$

$$\therefore \text{HCF} = 2a^2b^4$$

घात वाली संख्याओं का ल.स. तथा म.स. - घात वाली संख्याओं का LCM अधिकतम संख्या व बड़ी से बड़ी घात तथा HCF उभयनिष्ठ(Common) संख्या व छोटी से छोटी घात होता है।

Example-

1. $8^7 \times 5^{17} \times 11^5, 7^9 \times 5^{13} \times 11^{15}, 13^{12} \times 8^{10} \times 11^7, 17^{15} \times 6^6 \times 4^8$ का LCM ज्ञात करो ?

$$\text{हल} - 4^8 \times 5^{17} \times 6^6 \times 7^9 \times 8^{10} \times 11^{15} \times 13^{12} \times 17^{15}$$

यहाँ पर दी गई संख्याएँ 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17 हैं जिन पर बड़ी से बड़ी घात $4^8, 5^{17}, 6^6, 7^9, 8^{10}, 11^{15}, 13^{12}$ व 17^{15} हैं। जो कि LCM हैं।

2. $4^9 \times 5^7 \times 9^4, 5 \times 9^{13} \times 2^5$ का HCF ज्ञात करो?

$$\text{हल} - 5 \times 9^4$$

यहाँ पर कॉमन संख्या 5 व 9 हैं जिनपर छोटी घात 5 व 9^4 हैं। जो HCF हैं।

Note :- जब दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करना हो तो दी हुई संख्याओं का LCM, अभिष्ट संख्या होगी।

Note :- जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो जिससे दी हुई संख्याएँ पूर्णतः विभाजित हो, तो दी हुई संख्याओं का HCF अभिष्ट संख्या होती है।

Note :- दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है।

$$\text{प्रथम संख्या} \times \text{द्वितीय संख्या} = \text{LCM} \times \text{HCF}$$

Note :- जब दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात तथा HCF दिया गया हो तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपात को HCF से गुणा कर देते हैं।

Note :- जब (n) संख्याओं का LCM तथा HCF दे रखा हो व उनका गुणनफल पूछा गया हो तो -

$$\text{सूत्र} = (\text{HCF})^{n-1} \times \text{LCM}$$

Example :- तीन संख्याओं का HCF = 2 तथा LCM = 210 हैं, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ?

$$\text{हल} - 2^{3-1} \times 210 = 2^2 \times 210 = 4 \times 210 = 840$$

1st Type

1. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर सदैव 1 शेष बचे ?

$$\text{अभीष्ट संख्या} = (8, 9, 12, 15 \text{ का ल. स.}) + 1$$

$$= 360 + 1 = 361$$

2. वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5, 7, 12, 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3, 5, 10, 13 बचे ?

प्रश्न -19. नापने की तीन छड़े क्रमशः 64 सेमी, 80 सेमी तथा 96 सेमी लंबी हैं, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है?

- (a) 0.96 मीटर (b) 9.60 मीटर
(c) 19.20 मीटर (d) 96 मीटर

हल:

अभीष्ट नाप = 64 सेमी, 80 सेमी, 96 सेमी का ल. स

8	64, 80, 96
2	8, 10, 12
2	4, 5, 6
	2, 5, 3

= $(8 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 3)$ सेमी. = 960 सेमी.
= 9.60 मीटर

प्रश्न -20. टीनु दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है। परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच. क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता कर सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओ में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा?

- (a) 324 इंच (b) 288 इंच
(c) 248 इंच (d) 271 इंच

हल:

कपड़े की अभीष्ट लंबाई = 32 इंच तथा 36 इंच का ल. स.

= $(4 \times 8 \times 9)$ इंच = 288 इंच

प्रश्न -21. दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघूत्तम समापवर्त्य क्रमशः 12 तथा 600 हैं। यदि एक संख्या 24 हो, तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा?

हल:

निष्कर्ष 1. एक संख्या $\times$ दूसरी संख्या = दोनों संख्याओं का म. स. $\times$ ल. स. होता है।

निष्कर्ष 2. अतः दूसरी संख्या = $\frac{12 \times 600}{24} = 300$ होगी।

निष्कर्ष 3. अब दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है।

$\therefore$ औसत = $\frac{\text{दोनों संख्याओं का योग}}{2} = \frac{24+300}{2} = \frac{324}{2} = 162$

प्रश्न -22. भिन्न $\frac{2}{5}, \frac{3}{8}, \frac{4}{9}$ का म. स. ज्ञात कीजिए।

हल:

भिन्न का म. स. = $\frac{\text{अंशों का म.स.}}{\text{हरों का ल.स.}}$

अंशों का म. स. अर्थात् 2, 3, 4 का म. स. ज्ञात करना है।

$$2 = 1 \times 2$$

$$3 = 1 \times 3$$

$$4 = 1 \times 2 \times 2$$

म. स. = 1 (क्योंकि मात्र यही common factor है)

हरों का ल. स. अर्थात् 5, 8, 9 का ल. स. ज्ञात करना है-

$$\text{ल. स.} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 360$$

$$\begin{aligned} \text{अतः दी गई भिन्न का म. स.} &= \frac{\text{अंशों का म.स.}}{\text{हरों का ल.स.}} \\ &= \frac{1}{360} \end{aligned}$$

प्रश्न -23. भिन्न $\frac{2}{5}, \frac{3}{8}, \frac{4}{9}$ का ल. स. ज्ञात कीजिए।

हल:

भिन्न का ल. स. = $\frac{\text{अंशों का ल.स.}}{\text{हरों का म.स.}}$

अंशों का ल. स. अर्थात् 2, 3, 4 का ल. स. ज्ञात करना है।

2	2, 3, 4
2	1, 3, 2
3	1, 3, 1
	1, 1, 1

$$\text{ल. स.} = 2 \times 2 \times 3 = 12$$

हरों का म. स. अर्थात् 5, 8, 9 का म. स. ज्ञात करना है।

$$5 = 5 \times 1$$

$$8 = 2 \times 2 \times 2 \times 1$$

$$9 = 3 \times 3 \times 1$$

म. स. = 1 (क्योंकि ये ही कॉमन फैक्टर है।)

$$\begin{aligned} \text{अतः दी गई भिन्न का ल. स.} &= \frac{\text{अंशों का ल.स.}}{\text{हरों का म.स.}} \\ &= \frac{12}{1} = 12 \end{aligned}$$

प्रश्न -24. 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णाकों, जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हों, की कुल संख्या होगी-

हल:- सामान्य समझ पर

$$9, 6 \text{ का ल.स.} = 18$$



अतः इस संख्या से विभाज्य संख्या, जो 100 से 200 के बीच है

108, 126, 144, 162, 180 तथा 198 होंगी।

∴ कुल संख्या = 6

प्रश्न -25. एक व्यक्ति को, तीन द्रव पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल आयल के 496 लीटर को बिना एक दूसरे के मिलाए पूर्णतः समान माप की बोतलों में ऐसे डालना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भरी जाए। ऐसी बोतलों की कम से कम कितनी संख्या की आवश्यकता होगी?

हल: - परंपरागत विधि

तीनों द्रवों का म.स.

465)496 (1

465

31) 465 (15

465

31)403 (13

403

xxx

तीनों संख्याओं के म.स. के बराबर की माप वाली बोतलें होंगी जो कि 31 लीटर हैं।

पेट्रोल के लिए आवश्यक बोतल $403 \div 31 = 13$

डीजल के लिए आवश्यक बोतल $465 \div 31 = 15$

मोबिल के लिए आवश्यक बोतल $496 \div 31 = 16$

कुल बोतलों की संख्या = 44

प्रश्न -26. $8^3 \times 4^4 \times 10^2$, $4^3 \times 8 \times 10^3$, $8^2 \times 12 \times 4^2$ का महत्तम समापवर्तक होगा?

हल: $8^3 \times 4^4 \times 10^2$, $4^3 \times 8 \times 10^3$ एवं $8^2 \times 12 \times 4^2$ या

$(2^3)^3 \times (2^2)^4 \times 2^2 \times 5^2$,

$(2^2)^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 5^3, (2^3)^2 \times 2^2 \times 3(2^2)^2$

$= 2^9 \times 2^8 \times 2^2 \times 5^2$, $2^6 \times 2^3 \times 2^3 \times 5^3$,

$2^6 \times 2^2 \times 3 \times 2^4$

$= 2^{19}5^2$, $2^{12}5^3$, $2^{12}3$

तीनों में कॉमन 2 है तथा इसकी कॉमन घात 12 है।

अतः $2^{12} = 4096$ HCF होगा।

प्रश्न -27. पदों $8a^2b^2c$ एवं $16ab^2d$ का लघूत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें।

हल : $8a^2b^2c$ के गुणनखंड $2^3a^2b^2c$

$16ab^2d$ के गुणनखंड $2^4 \times ab^2d$

LCM = दोनों में प्रत्येक गुणांक एवं व्यंजक की उच्चतम घातों का गुण = $2^4 \times a^2 \times b^2 \times c \times d$

(LCM) = $16a^2b^2cd$

प्रश्न -28. 4^{-6} , 4^{-2} , 4^{-9} , 4^{-1} का लघूत्तम समापवर्त्य होगा।

हल:- 4^{-6} , 4^{-2} , 4^{-9} , 4^{-1} में सभी पदों के आधार (4) समान है। अतः 4 की सबसे बड़ी घात 4^{-1} ही लघूत्तम समापवर्त्य (LCM) होगा।

प्रश्न -29. 2^3 , 3^2 , 4 तथा 15 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

हल: 2^3 , 3^2 , 4, 15

अर्थात् 8, 9, 4, 15 का म. स. = 1

Some Examples

(1) दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघूत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 हैं यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी ?

Ans. माना दूसरी संख्या = x

∴ पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या = LCM $\times$ HCF

$8 \times 48 = 24 \times x$

$x = \frac{8 \times 48}{24} = 16$

(2) 12 के दो गुणजों का लघूत्तम समापवर्त्य 1056 है यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी ?

Ans. एक संख्या = 132 = 12×11

माना दूसरी संख्या = $12x$

∴ LCM = $132x$

$132x = 1056$

$x = \frac{1056}{132} = 8$

दूसरी संख्या = $12 \times 8 = 96$ Ans.

(3) दो संख्याएँ 3 : 4 के अनुपात में हैं तथा इनका LCM 84 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए ?

Ans. माना ये $3x$ तथा $4x$ हैं !

LCM = $12x$

$12x = 84 \Rightarrow x = 7$

संख्याएँ $3 \times 7 = 21$, $4 \times 7 = 28$

बड़ी संख्या = 28

(4) वह छोटी से छोटी संख्या कौनसी है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे ?



अध्याय - 7

बीजगणित

बीजगणित के सूत्र

- $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$
- $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$
- $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$
- $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$
- $(a + \frac{1}{a})^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} + 2$
- $(a + \frac{1}{a})^2 = (a - \frac{1}{a})^2 + 4$
- $(a - \frac{1}{a})^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} - 2$
- $(a - \frac{1}{a})^2 = (a + \frac{1}{a})^2 - 4$
- $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$
- $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 4\sqrt{ab}$
- $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a + b - 2\sqrt{ab}$
- $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - 4\sqrt{ab}$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$
- $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$
- $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$
- $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
- $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2$
- $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
- $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3a^2b + 3ab^2$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $\frac{a^3 + b^3}{a^2 + b^2 - ab} = a + b$
- $\frac{a^2 + b^2 - ab}{a^3 + b^3} = \frac{1}{a + b}$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $\frac{a^3 - b^3}{a^2 + b^2 + ab} = a - b$
- $\frac{a^2 + b^2 + ab}{a^3 - b^3} = \frac{1}{a - b}$
- $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$

- $(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(ab^2 + ac^2 + ba^2 + bc^2 + ca^2 + cb^2 + 2abc)$
- $(a - b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ca$
- $(a + b)^4 = a^4 + b^4 + 4a^3b + 4ab^3 + 6a^2b^2$
- $(a - b)^4 = a^4 + b^4 - 4a^3b - 4ab^3 + 6a^2b^2$

- यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो तो $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$

$$[x + \frac{1}{x}]^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 \times x \times \frac{1}{x}$$

$$a^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 - 2$$

- Ex :- यदि $x + \frac{1}{x} = 7$ हो तो $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 7^2 - 2 = 49 - 2 = 47 \text{ Ans.}$$

इसका भाई

$$x^2 - \frac{1}{x^2} = \sqrt{47^2 - 4}$$

$$= \sqrt{2909 - 4} = \sqrt{2905}$$

- यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो तो $x^4 + \frac{1}{x^4} = ?$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 - 2$$

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = (a^2 - 2)^2 - 2 = a^4 - 4a^2 + 2$$

- Ex :- यदि $x + \frac{1}{x} = 5$ हो तो $x^4 + \frac{1}{x^4} = ?$

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = (5^2 - 2)^2 - 2 = (25 - 2)^2 - 2$$

$$= 23^2 - 2 = 529 - 2 = 527 \text{ Ans.}$$

- यदि $x - \frac{1}{x} = a$ हो तो $x^4 + \frac{1}{x^4} = ?$

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = (a^2 + 2)^2 - 2$$

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = a^4 + 4a^2 + 2$$

- Ex :- $x - \frac{1}{x} = 3$ हो तो $x^4 + \frac{1}{x^4} = ?$

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = (3^2 + 2)^2 - 2$$

$$(9 + 2)^2 - 2 = 11^2 - 2$$

$$121 - 2 = 119$$

- यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = a$ हो तो $x + \frac{1}{x} = ?$

$$[x + \frac{1}{x}]^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 \times x \times \frac{1}{x}$$

$$[x + \frac{1}{x}]^2 = a + 2$$



$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{a+2}$$

Ex :- यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 50$ हो तो $x + \frac{1}{x} = ?$

हम जानते हैं की $x + \frac{1}{x} = \sqrt{a+2}$

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{50+2} = \sqrt{52} \text{ Ans.}$$

• यदि $x - \frac{1}{x} = a$ हो तो $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$
 $[x - \frac{1}{x}]^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 \times x \times \frac{1}{x}$
 $a^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} - 2$
 $x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 + 2$

Ex :- यदि $x - \frac{1}{x} = 7$ हो तो $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 7^2 + 2 = 49 + 2 = 51 \text{ Ans.}$$

• यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = a$ हो तो $x - \frac{1}{x} = ?$
 $[x - \frac{1}{x}]^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 \times x \times \frac{1}{x}$
 $[x - \frac{1}{x}]^2 = a - 2$
 $x - \frac{1}{x} = \sqrt{a-2}$

Ex :- यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 50$ हो तो $x - \frac{1}{x} = ?$

हम जानते हैं की $x - \frac{1}{x} = \sqrt{a-2}$

$$x - \frac{1}{x} = \sqrt{50-2} = \sqrt{48} \text{ Ans.}$$

त्रिकोणमिति और बीजगणित में घात तिगुनी करने का अर्थ होता है घन करना

घन करना है तो घन ही करो लेकिन साथ में $\pm$ तिगुना लिखो और चिह्न उल्टा लगा दो !

Ex :- यदि $x + \frac{1}{x} = 5$ हो तो $x^3 + \frac{1}{x^3} = ?$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 5^3 - 5 \times 3 = 110 \text{ Ans.}$$

किसी भी संख्या के उपर 0 घात लगाने का परिणाम गणित में 1 माना जाता है !

जैसे :- $2^0 = 1$

त्रिकोणमिति और बीजगणित में घात तिगुनी करने का अर्थ होता है घन करना :-

घन करना हो तो घन ही करो साथ में $\pm$ तिगुना लिखो और चिह्न उल्टा लगावों !

त्रिकोणमिति और बीजगणित में व्युत्क्रम संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने का तरीका :-

(1) + वाला घनमूल :- तुरन्त बड़ी संख्या का घनमूल

(2) - वाला घनमूल :- तुरन्त छोटी संख्या वाला का घनमूल

Ex:- यदि $x + \frac{1}{x} = 3$ तो $x^5 + \frac{1}{x^5} = ?$

हम जानते हैं - $x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 - 2$

तो $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3^2 - 2 = 9 - 2 = 7$

इसी प्रकार

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 3^3 - 3 \times 3 = 27 - 9 = 18$$

अब $x^5 + \frac{1}{x^5} = [x^2 + \frac{1}{x^2}][x^3 + \frac{1}{x^3}] - [x + \frac{1}{x}]$

$$x^5 + \frac{1}{x^5} = 18 \times 7 - 3$$

$$= 126 - 3 = 123 \text{ Ans.}$$

Ex:- यदि $x + \frac{1}{x} = 4$ तो $x^5 + \frac{1}{x^5} = ?$

(SSC -2021)

(a) 776

(b) 773

(c) 724

(d) 684

Ans(3) 724

हम जानते हैं - $x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 - 2$

तो $x^2 + \frac{1}{x^2} = 4^2 - 2 = 16 - 2 = 14$

इसी प्रकार

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 4^3 - 3 \times 4 = 64 - 12 = 52$$

अब $x^5 + \frac{1}{x^5} = [x^2 + \frac{1}{x^2}][x^3 + \frac{1}{x^3}] - [x + \frac{1}{x}]$

$$x^5 + \frac{1}{x^5} = 52 \times 14 - 4$$

$$= 728 - 4 = 724 \text{ Ans.}$$

Ex:- यदि $x^3 + \frac{1}{x^3} = 18$ तो $x + \frac{1}{x} = ?$

यह हमें 18 से ठीक बड़ी घन वाली संख्या 27 का घनमूल करने पर प्राप्त होगा !

$$\sqrt[3]{27} = 3,$$

क्योंकि प्रश्न में + का चिह्न है इसलिए 18 से बड़ी घन संख्या देखी !

अतः $x + \frac{1}{x} = \sqrt[3]{27} = 3 \text{ Ans.}$

1. यदि $x^3 - \frac{1}{x^3} = 140$ तो $x - \frac{1}{x} = ?$



$$= \pm \frac{4\sqrt{\text{गुणा}}}{\text{अन्तर}}$$

यहाँ $\pm$ चिह्न प्रश्न का पहला चिह्न देखकर लगाया जायेगा।

20. $\frac{\sqrt{10}+\sqrt{6}}{\sqrt{10}-\sqrt{6}} - \frac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}}$ solve it

$$= \pm \frac{4\sqrt{\text{गुणा}}}{\text{अन्तर}} = + \frac{4\sqrt{60}}{4} = + \sqrt{60}$$

क्योंकि प्रश्न की शुरुआत में $+$ चिह्न है!

21. $\frac{\sqrt{9}+\sqrt{4}}{\sqrt{9}-\sqrt{4}} - \frac{\sqrt{9}-\sqrt{4}}{\sqrt{9}+\sqrt{4}}$ find value .

$$= + \frac{4\sqrt{\text{गुणा}}}{\text{अन्तर}} = + \frac{4\sqrt{36}}{5} = \frac{24}{5} = 4.8$$

22. $x = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

(1) $x + \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

यहाँ अन्त वर्गान्तर है!

$$= \frac{2 \times \text{योग}}{\text{अन्तर}} = \frac{2 \times 8}{2} = 8$$

(2) $x - \frac{1}{x} = + \frac{4\sqrt{\text{गुणा}}}{\text{अन्तर}}$
 $= \frac{4\sqrt{15}}{2} = 2\sqrt{15}$

23. $x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}} = x^{1.5} + \frac{1}{x^{1.5}}$ होता है!

पहचान-1 :- इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई संख्याएँ लगातार संख्याओं के रूप में होती हैं!

तरीका = बड़ी - छोटी

पहचान - 2 :- नीचे और बीच के चिह्न $+$ के होंगे!

type - 2

समान्तर श्रेणी रूप में (2 या 3 का अन्तर)

24. $\frac{1}{\sqrt{441}+\sqrt{438}} + \frac{1}{\sqrt{438}+\sqrt{435}} + \frac{1}{\sqrt{435}+\sqrt{432}}$
 $+ \dots + \frac{1}{\sqrt{12}+\sqrt{9}}$

$$\frac{\sqrt{441}-\sqrt{438}}{3} + \frac{\sqrt{438}-\sqrt{435}}{3} + \frac{\sqrt{435}-\sqrt{432}}{3} + \dots + \frac{\sqrt{12}-\sqrt{9}}{3}$$

$$= \frac{\sqrt{441}-\sqrt{9}}{3} = \frac{21-3}{3} = \frac{18}{3} = 6$$

$$= \frac{\text{बड़ी}-\text{छोटी}}{\text{अन्तर}}$$

पहचान :- इस प्रकार के प्रश्नों में सभी चिह्न $(+)$ के होते हैं लेकिन दी गई संख्याएँ समान्तर श्रेणी में मौजूद होती हैं!

तरीका = $\frac{\text{बड़ी}-\text{छोटी}}{\text{अन्तर}}$

type - I बड़ी से छोटी

$$\frac{1}{\sqrt{144}+\sqrt{143}} + \frac{1}{\sqrt{143}+\sqrt{142}} + \frac{1}{\sqrt{142}+\sqrt{141}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{37}+\sqrt{36}}$$

$$\sqrt{144} - \sqrt{143} + \sqrt{143} - \sqrt{142} + \sqrt{142} - \sqrt{141} - \dots - \sqrt{37} - \sqrt{36}$$

$$= \sqrt{144} - \sqrt{36} = 12 - 6 = 6$$

बड़ी - छोटी = 6

25. $\frac{1}{\sqrt{100}+\sqrt{99}} + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{98}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{26}+\sqrt{25}}$

(a) 6

(b) 5

(c) 7

(d) 2

तरीका = $\frac{\text{बड़ी}-\text{छोटी}}{\text{अन्तर}}$

type - II बड़ी - छोटी

solution :- $\sqrt{100} - \sqrt{25} = 10 - 5 = 5$

Note :- यदि किन्हीं दो संख्याओं के बीच $+$ अथवा गुणा का चिह्न हो तो उनका क्रम बदला जा सकता है! यदि वे किसी अन्य व्यंजक connect नहीं हो!

type - III जब नीचे पूरे चिह्न $(-)$ के हो

$$\frac{1}{\sqrt{100}-\sqrt{99}} - \frac{1}{\sqrt{99}-\sqrt{98}} + \frac{1}{\sqrt{98}+\sqrt{97}} - \dots + \frac{1}{\sqrt{97}+\sqrt{96}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{26}+\sqrt{25}}$$

$$\sqrt{100} + \sqrt{99} - (\sqrt{99} + \sqrt{98}) + (\sqrt{98} + \sqrt{97}) - \dots + (\sqrt{26} + \sqrt{25})$$

$$= \sqrt{100} + \sqrt{25} = 10 + 5 = 15 \text{ यहाँ } + \text{ का}$$

चिह्न लास्ट form के पहले चिह्न के हिसाब से आता है!

तरीका = बड़ी $\pm$ छोटी



$$26. \frac{1}{\sqrt{289}-\sqrt{288}} - \frac{1}{\sqrt{288}-\sqrt{287}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{1}}$$

(a) 16

(c) 18

(c) 17

(d) इनमें से कोई नहीं

इस प्रश्न में नीचे के सभी चिन्ह (-) होते हैं लेकिन बीच के चिन्ह $\pm$ एकान्तर रूप में बदलते हैं !

घात और आधार :-

a^x → घात

↙ आधार

$$a^x = b \Rightarrow a = b^{1/x} \text{ या } a = \sqrt[x]{b}$$

$$b^{1/x} = \sqrt[x]{b} \text{ व } b^x = \sqrt[x]{b} \text{ व } b^{y/x} = \sqrt[y]{b^x}$$

घातांक (Indices)

यदि n एक घन पूर्णांक तथा a कोई वास्तविक संख्या हो तो

$$a^n = a \times a \times a \times a \times a \times \dots \times a \text{ (n बार)}$$

a^n को a का n वाँ घात कहा जाता है वास्तविक संख्या a को आधार तथा n को a के n वें घात का घातांक कहा जाता है।

घातांक के नियम

$$\bullet a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\bullet \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\bullet (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\bullet (ab)^n = a^n b^n$$

$$\bullet \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\bullet a^0 = a^{m-m} = \frac{a^m}{a^m} = 1 \text{ (जिस संख्या की घात शून्य हो उसका मान 1 होता है)}$$

$$\bullet \frac{1}{a^{-n}} = a^n \text{ जैसे: } \frac{1}{5^{-2}} = 5^2 \text{ (घातांक वाली संख्या को ऊपर या नीचे बदलने पर उसकी घात के चिह्न (-,+)) बदल जाते हैं)}$$

$$\bullet \left[\frac{a}{b}\right]^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\bullet a^m + a^n + a^k = a^{m+n+k}$$

जैसे:-

$$2^1 \times 2^2 \times 2^3$$

$$2^{1+2+3} = 2^6$$

$$\bullet \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$\bullet a^n + a^{n+m} \Rightarrow a^n(a^0 + a^m)$$

$$\text{जैसे } - 6^{14} + 6^{14+2} \Rightarrow 6^{14}(6^0 + 6^2)$$

$$\Rightarrow 6^{14}(1 + 36) = 37 \times 6^{14}$$

• $a^n = a^m$ हो तो $n = m$ होगा, क्योंकि आधार समान है। इसलिए घात भी समान होगी।

• $a^n = b^n$ हो तो $a = b$ होगा, क्योंकि घातांक समान है। अतः आधार भी समान होगा।

• जब आधार व घातें समान नहीं हो -

$$a^n = b^m \text{ हो तो } a = b^{m/n} \text{ या } b = a^{n/m}$$

$$\text{जैसे } - 9^{12} = x^4 \Rightarrow x = 9^{12/4} \Rightarrow x = 9^3$$

करणी (Surd)

जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सके, ऐसी संख्या के मूल को करणी (Surd) अथवा अमूलक संख्या (Irrational Quantity) कहते हैं।

जैसे- $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{4}$ आदि करणी (Surd) अथवा अमूलक संख्या हैं।

करणी के प्रकार (Types of Surds)

1. **शुद्ध करणी (Pure Surds):-** ऐसी करणी जिसका परिमेय गुणनखण्ड हो, शुद्ध करणी कहलाती है।

2. **मिश्र करणी (Mixed Surds):-** ऐसी करणी जिसका एक गुणनखण्ड के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या हो, मिश्र करणी कहलाती है।

3. **समरूप अथवा सजातीय करणी (Similar or Like Surds):-** जिन करणियों के अपरिमेय गुणनखण्ड समान होते हैं, समरूप या सजातीय करणियाँ कहलाती हैं।

4. **संयुग्मी करणी (Conjugate Surds):-** द्विपद वाली ऐसी दो करणियाँ जिनके दोनों पद समान हो परन्तु दोनों करणियों में दोनों पदों के बीच केवल '+' और '-' चिह्न का अन्तर हो, संयुग्मी करणी कहलाती हैं।

जैसे:- $(2 + \sqrt{3})$ की संयुग्मी करणी $(2 - \sqrt{3})$ होगी।

करणियों का जोड़, घटाव, गुणनफल तथा भाजन

करणियों का जोड़, घटाव, गुणन और भाजन केवल समान घात समरूपद्ध वाली करणियों में किया जाता है, यदि करणियाँ समान घात में न हो, तो सबसे पहले उन्हें समान घात में बनाया जाता है फिर उनका जोड़, घटाव, गुणन तथा भाजन किया जाता है।

उदाहरण:

1. समान करणियों का जोड़

$$= \sqrt{3} + 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3}$$

$$= \sqrt{3}(1 + 2 + 4)$$

$$= 7\sqrt{3}$$

$$(3) x = \sqrt{7 - \sqrt{7 - \sqrt{7 - \sqrt{7} \dots \infty}}}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{\sqrt{4a+1}-1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{28+1}-1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{29}-1}{2} \end{aligned}$$

$$(4) x = \sqrt{19 - \sqrt{19 - \sqrt{19 - \sqrt{19} \dots \infty}}}$$

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{19 - \sqrt{19 - \sqrt{19} \dots \infty}} \\ x &= \frac{\sqrt{4a+1}-1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{76+1}-1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{77}-1}{2} \end{aligned}$$

$$(5) m = \sqrt{10 + \sqrt{10 + \sqrt{10 + \sqrt{10} \dots \infty}}}$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{\sqrt{4a+1}+1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{4 \times 10 + 1} + 1}{2} = \frac{\sqrt{41} + 1}{2} \end{aligned}$$

Type-5

$$m = \sqrt{a + \sqrt{a - \sqrt{a + \sqrt{a - \sqrt{a} \dots \infty}}}}$$

$$m = \frac{\sqrt{4a-3}+1}{2}$$

$$(1) x = \sqrt{12 + \sqrt{12 - \sqrt{12 + \sqrt{12} \dots \infty}}}$$

$$x = \frac{\sqrt{4a-3}+1}{2}$$

$$x = \frac{\sqrt{45}+1}{2}$$

$$x = \frac{3\sqrt{5}+1}{2}$$

$$(2) x = \sqrt{5 + \sqrt{5 - \sqrt{5 + \sqrt{5 - \sqrt{5} \dots \infty}}}}$$

$$x = \frac{\sqrt{4a-3}+1}{2}$$

$$x = \frac{\sqrt{17}+1}{2}$$

$$(3) M = \sqrt{9 + \sqrt{9 - \sqrt{9 + \sqrt{9} \dots \infty}}}$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{\sqrt{4 \times 9 - 3} + 1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{33} + 1}{2} \end{aligned}$$

Type-6

$$N = \sqrt{a - \sqrt{a + \sqrt{a - \sqrt{a + \sqrt{a} \dots \infty}}}}$$

$$N = \frac{\sqrt{4a-3}-1}{2}$$

$$(1) x = \sqrt{3 - \sqrt{3 + \sqrt{3 - \sqrt{3 + \sqrt{3} \dots \infty}}}}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{\sqrt{4a-3}-1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{4 \times 3 - 3} - 1}{2} \\ &= \frac{3-1}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$B. x = \sqrt{8 - \sqrt{8 + \sqrt{8 - \sqrt{8} \dots \infty}}}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{\sqrt{4 \times 8 - 3} - 1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{29} - 1}{2} \end{aligned}$$

$$(3) x = \sqrt{10 - \sqrt{10 + \sqrt{10 - \sqrt{10} \dots \infty}}}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{\sqrt{4 \times 10 - 3} - 1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{37} - 1}{2} \end{aligned}$$

Type-7

$$P = \sqrt{a + b \sqrt{a + b \sqrt{a + b \sqrt{a + b \sqrt{a} \dots \infty}}}}$$

$$P = \frac{b + \sqrt{4a + b^2}}{2}$$

$$(1) P = \sqrt{4 + 3 \sqrt{4 + 3 \sqrt{4 + 3 \sqrt{4} \dots \infty}}}$$



$$\frac{1}{2x} + \frac{1}{4y} + \frac{1}{6z}$$

$$= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24}$$

$$= \frac{1}{8}$$

(9) यदि $2^x = 3^y = 6^{-z}$, तो $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = ?$

$$2^x = 3^y = 6^{-z} = k$$

$$2^x = k, \quad 3^y = k, \quad 6^{-z} = k$$

$$2 = k^{1/x}, \quad 3 = k^{1/y}, \quad 6 = k^{-1/2}$$

$$2 \times 3 = 6$$

$k^{1/x} \times k^{1/y} = k^{-1/2}$ आधार समान तो घाते जुड़ जाती हैं !

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = -\frac{1}{z}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$$

(10) $2^{72}, 5^{36}, 4^{48}, 3^{60}$ में कौन बड़ा है ?

$$2^{72}, 5^{36}, 4^{48}, 3^{60}$$

$$(2^6)^{12}, (5^3)^{12}, (4^4)^{12}, (3^5)^{12}$$

$$64^{12}, 125^{12}, 256^{12}, 243^{12}$$

$$256^{12} = 4^{48} \text{ बड़ा है !}$$

Note :- इस प्रकार के प्रश्नों में यदि आधार समान हैं तो जिसकी घात बड़ी होगी वह संख्या भी बड़ी होगी ! यदि आधार समान नहीं हैं तो घाते समान होंगी अथवा की जा सकती हैं जिसका आधार बड़ा वह संख्या बड़ी होगी !

(11) $2^{350}, 5^{200}, 3^{300}, 4^{250}$ में कौन बड़ा है ?

$$2^{350}, 5^{200}, 3^{300}, 4^{250}$$

$$2^{7 \times 50}, 5^{4 \times 50}, 3^{6 \times 50}, 4^{5 \times 50}$$

$$128^{50}, 625^{50}, 729^{50}, 1024^{50}$$

$$4^{250} \text{ बड़ा है।}$$

(12) निम्न में से कौन बड़ा है।

$$\sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{6}, \sqrt[6]{15}, \sqrt[12]{245} \quad 3, 4, 6, 12,$$

$$4^{1/3}, 6^{1/4}, 15^{1/6}, 245^{1/12} \text{ का L.C.M}$$

$$4^{\frac{1}{3}}, 6^{\frac{1}{4}}, 15^{\frac{1}{6}}, 245^{\frac{1}{12}}$$

$$4^{\frac{1}{3} \times 12}, 6^{\frac{1}{4} \times 12}, 15^{\frac{1}{6} \times 12}, 245^{\frac{1}{12} \times 12}$$

$$4^4, 6^3, 15^2, 245^1$$

$$256, 216, 225, 245$$

$$\sqrt[3]{4} \text{ बड़ा है !}$$

(13) निम्न में से कौन बड़ा है ?

$$\sqrt{10} - \sqrt{8} \text{ तथा } \sqrt{15} - \sqrt{13}$$

$$\frac{\sqrt{10} - \sqrt{8}}{1}$$

परिमेय करण करने पर

$$\sqrt{10} - \sqrt{8} \times \left(\frac{\sqrt{10} + \sqrt{8}}{\sqrt{10} + \sqrt{8}} \right)$$

$$\frac{10-8}{\sqrt{10} + \sqrt{8}} = \frac{2}{\sqrt{10} + \sqrt{8}}$$

$$\frac{2}{\sqrt{10} + \sqrt{8}} > \frac{2}{\sqrt{15} + \sqrt{13}}$$

$$\frac{\sqrt{15} - \sqrt{13}}{1}$$

(14) $(\sqrt{10} + \sqrt{6})^2 = 10 + 6 + 2\sqrt{10 \times 6}$

$$= 16 + 2\sqrt{60}$$

$$(\sqrt{9} + \sqrt{7})^2 = 9 + 7 + 2\sqrt{9 \times 7}$$

$$= 16 + 2\sqrt{63}$$

$$(\sqrt{9} + \sqrt{7})^2 \text{ बड़ा है !}$$

(15) निम्न में से कौन बड़ा है ?

$$\sqrt{10} - \sqrt{8} \text{ तथा } \sqrt{15} - \sqrt{13}$$

$$\frac{\sqrt{10} - \sqrt{8}}{1}$$

परिमेय करण करने पर

$$\sqrt{10} - \sqrt{8} \times \left(\frac{\sqrt{10} + \sqrt{8}}{\sqrt{10} + \sqrt{8}} \right)$$

$$\frac{10-8}{\sqrt{10} + \sqrt{8}} = \frac{2}{\sqrt{10} + \sqrt{8}}$$

$$\frac{2}{\sqrt{10} + \sqrt{8}} > \frac{2}{\sqrt{15} + \sqrt{13}}$$

$$\frac{\sqrt{15} - \sqrt{13}}{1}$$

परिमेय करण पर

$$(\sqrt{15} - \sqrt{13}) \times \left(\frac{\sqrt{15} + \sqrt{13}}{\sqrt{15} + \sqrt{13}} \right)$$

$$\frac{15-13}{\sqrt{15} + \sqrt{13}} = \frac{2}{\sqrt{15} + \sqrt{13}}$$



अध्याय - 14

साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज

ब्याज :- उधार ली गयी धन राशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं !

साधारण ब्याज :- जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिये एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं !

साधारण ब्याज से सम्बन्धित सूत्र :-

$$\text{साधारण ब्याज (S.I.)} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100} = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$\text{ब्याज की दर (r)} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{समय}} = \frac{S.I. \times 100}{P \times T}$$

$$\text{समय (t)} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{दर}} = \frac{S.I. \times 100}{P \times R}$$

$$\text{मूलधन (P)} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{दर} \times \text{समय}} = \frac{S.I. \times 100}{R \times T}$$

$$\text{मूलधन (P)} = \frac{\text{मिश्रधन} \times 100}{100 + (\text{दर} \times \text{समय})}$$

मिश्रधन = मूलधन + ब्याज

$$A = P + \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$\# S.I. = \frac{P \times R \times T}{100}$$

∴ प्रत्येक स्थिति में समान ब्याज हो

$$\therefore P_1 r_1 t_1 = P_2 r_2 t_2 = P_3 r_3 t_3$$

$$= P_1 : P_2 : P_3 = \frac{1}{r_1 t_1} : \frac{1}{r_2 t_2} : \frac{1}{r_3 t_3}$$

$$r_1 : r_2 : r_3 = \frac{1}{p_1 t_1} : \frac{1}{p_2 t_2} : \frac{1}{p_3 t_3}$$

$$t_1 : t_2 : t_3 = \frac{1}{p_1 r_1} : \frac{1}{p_2 r_2} : \frac{1}{p_3 r_3}$$

Ex-1 एक धन को 10% की दर से 4 वर्ष 12.5% की दर से 2 वर्ष तथा 15% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया हो तो तथा प्रत्येक से समान मिश्रधन प्राप्त हो तो मूलधन क्या होगा ?

$$10 \times 4 = 40$$

$$12.5 \times 2 = 25$$

$$15 \times 3 = 45$$

$$p_1 \times \frac{140}{100} = p_2 \times \frac{125}{100} = p_3 \times \frac{145}{100}$$

$$p_1 : p_2 : p_3 = \frac{1}{140} : \frac{1}{125} : \frac{1}{145} \\ = 28 : 25 : 29$$

$$(25 \times 29) : (28 \times 29) : (28 \times 25)$$

किसी धन को r_1 दर t_1 समय के लिए r_2 दर t_2 समय के लिए ब्याज अन्तर n हो तो मूलधन = ?

$$= \frac{p_1 r_1 t_1}{100} - \frac{p_2 r_2 t_2}{100} = n$$

$$p (r_1 t_1 - r_2 t_2) = 100 n$$

$$p = \frac{100 \times n}{r_1 t_1 - r_2 t_2}$$

दर :- 100 Rs पर 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज, ब्याज की दर कहलाती है ! दर की गणना 100 पर होती है ! जैसे - 100 Rs का धन 1 वर्ष में 110 Rs हो जाता है तो यहाँ ब्याज की दर 10% है !

Type - 1 साधारण प्रश्न

1. साधारण ब्याज की किस दर से Rs 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 Rs हो जायेगा !

$$\text{दर (r)} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{समय}} \\ = \frac{120 \times 100}{600 \times 10} \\ = 2 \%$$

2 Method

$$\text{दर \%} \times \text{समय} = \text{ब्याज} \quad r \times 10 = 120$$

$$r \% \times t = S.I. \quad r = 12\%$$

$$600 \rightarrow 12 \%$$

$$100 \rightarrow \frac{12}{6} \\ = 2 \%$$

2. 100 Rs का 15 % की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा !

$$\text{सा. ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100} \\ = \frac{100 \times 15 \times 2}{100} \\ = 30 \text{ Rs}$$

2 Method

$$\text{ब्याज} = \text{दर \%} \times \text{समय}$$

$$= 2 \times 15$$

$$\text{ब्याज} = 30 \text{ Rs}$$

3. Rs 6000 पर 6 % वार्षिक दर से 8 माह का सा. ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिये !

$$\text{समय} = 8 \text{ माह} = \frac{8}{12} \\ = \frac{2}{3} \text{ वर्ष}$$

$$\text{सा. ब्याज} = \frac{6000 \times 6 \times 2}{3 \times 100}$$

$$\text{ब्याज} = 240 \text{ Rs}$$



2. कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 Rs तथा 8 वर्षों में 1200 Rs हो जाती है ! मूलधन बताओ !

माना मूलधन = P

$$3 \text{ वर्षों में ब्याज} = 1200 - 1020 = 180$$

$$1 \text{ वर्ष में} = 60 \text{ Rs}$$

$$5 \text{ वर्ष में} = 300 \text{ Rs}$$

$$\text{मूलधन } P = 1020 - 300 = 720 \text{ Rs}$$

3. कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में Rs 1950 हो जाता है 8 वर्षों में कितने Rs हो जायेगा !

माना मूलधन = 100

$$100 \xrightarrow{5\% \times 6 = 30\%} 130$$

$$130 \xrightarrow{5\% \times 8 = 40\%} 140$$

$$130 = 1950$$

$$= 15$$

$$140 = 15 \times 140$$

$$= 2100 \text{ Rs}$$

4. कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में Rs 1210 हो जाता है तो कितने वर्षों में Rs 1350 हो जायेगा !

$$100 \xrightarrow{7 \times 3 = 21} 121$$

$$121 = 1210$$

$$1 = 10$$

$$100 = 1000 \text{ Rs}$$

$$\text{मूलधन} = 1000 \text{ Rs}$$

$$\text{ब्याज} = 1350 - 1000$$

$$= 350 \text{ Rs}$$

$$\text{समय} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{दर} \times \text{मूलधन}}$$

$$= \frac{350 \times 100}{7 \times 1000}$$

$$\text{समय} = 5 \text{ वर्ष}$$

Method

$$1000 \xrightarrow{7\% \times 3 y} 1210$$


$$1210 \xrightarrow{7\% \times 5 y} 1350$$

$$\text{समय} = 5 \text{ वर्ष}$$


Type - 6

ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न-

1. गोपाल ने Rs 5000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया ! 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ ! 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिये !



2. 3100 Rs की एक धनराशि दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है ! एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग पर 6% की दर से दिया जाता है ! यदि कुल वार्षिक ब्याज Rs 212 है तो 8% की दर पर दी गयी धनराशि क्या है ?



$$13 + 18 = 31 \quad 1300 \text{ Rs}$$

$$31 = 3100$$

$$1 = 100$$

$$13 = 13 \times 100$$

$$= 1300 \text{ Rs}$$

3. एक व्यक्ति Rs 10000 का ऋण लेता है ! उसका एक भाग वह 8% वार्षिक की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है ! अंत में वह कुल ब्याज के रूप में Rs 950 वार्षिक का भुगतान करता है ! तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था?



$$= 72$$

$$= \frac{6P}{100} = 72$$

$$= P = \frac{72 \times 100}{6}$$

$$P = 1200$$

4. साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है इस धन को तिगुना करने में कितना समय लगेगा ?

$$\text{हल} \rightarrow \text{माना मूलधन} = n$$

$$\text{समय} = 20 \text{ वर्ष}$$

$$\text{मिश्रधन} = 2n$$

$$\text{अतः S.I.} = (2n - n) = n$$

$$\text{दर} = \left(\frac{100 \times n}{n \times 20} \right) = 5\% \text{ वार्षिक}$$

$$\text{अतः मूलधन} = n \quad \text{दर} = 5\%$$

$$\text{मिश्रधन} = 3n$$

$$\therefore \text{S.I.} = (3n - n) = 2n$$

$$\therefore \text{समय} = \left(\frac{100 \times 2n}{n \times 5} \right) = 40 \text{ वर्ष}$$

5. कोई व्यक्ति 5000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग पर 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है दो वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये है उपयुक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5000 रुपये को किस अनुपात में बाँटना चाहिए ?

$$\text{हल} \rightarrow \frac{440 \times 100}{5000 \times 2} = 4.4\%$$

$$\begin{array}{ccc} 4 & & 5 \\ & \searrow & \nearrow \\ & 4.4 & \\ & \nearrow & \searrow \\ 0.6 & & 0.4 \\ 3 & : & 2 \end{array}$$

6. किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का $\frac{4}{9}$ है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर होगी ?

$$\text{हल} \rightarrow \text{माना मूलधन} = P, \text{ दर} = n$$

$$= \frac{P \times n \times n}{100} = SI$$

$$= \frac{9 \times n \times n}{100} = 4$$

$$= n^2 = \frac{4 \times 100}{9}$$

$$n = \frac{2 \times 10}{3}$$

$$= 6\frac{2}{3} \text{ Ans.}$$

7. साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 18 महीनों में 12000 रु की राशि 15000 रु हो जाती है। यदि साधारण ब्याज पर 30 महीने के लिए समान दर पर 5000 रुपये निवेश किए जाते हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल} \rightarrow \text{माना ब्याज की दर } r\% \text{ है।}$$

$$SI = 15000 - 12000 = \text{Rs. } 3000$$

$$3000 = \frac{12000 \times R \times 18}{12 \times 100}$$

$$R = \frac{100}{6}\%$$

$$\text{Required amount} = 5000 + \frac{5000 \times 100 \times 30}{100 \times 6 \times 12} = \text{Rs. } 7083.33$$

8. एक आदमी ने 60,000 रुपये जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से, साधारण ब्याज पर उधार दिए यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि थी ?

$$\text{हल} \rightarrow \left(\frac{2560 \times 100}{60,000} \right) = \frac{256}{60}$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & & 4 \\ & \searrow & \nearrow \\ & \frac{256}{60} & \\ & \nearrow & \searrow \\ \frac{16}{60} & & \frac{44}{60} \\ 4 & : & 11 = 15 \quad 15 = 60,000 \\ 16000 & & 44000 \quad 1 = 4000 \end{array}$$

9. यदि किसी धनराशि पर $7\frac{1}{2}\%$ वार्षिक की दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर $12\frac{1}{2}\%$ वार्षिक की दर से 8 मास के साधारण ब्याज से 32.50 रुपये अधिक है तो वह धनराशि होगी ?

$$\text{हल} \rightarrow \left[\frac{100}{\left(\frac{15}{2} \times \frac{15}{12} \right) - \left(\frac{25}{2} \times \frac{8}{12} \right)} \right] \times 32.5$$

$$= 96 \times 32.5$$

$$= 3120$$



$$= \frac{57876}{5}$$

$$\therefore C.I. = \left(\frac{57876}{5} - 10,000 \right)$$

$$= \frac{7876}{5} = 1575.20 \text{ Ans}$$

3. 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा?

$$\text{हल} \rightarrow S.I. = \left(\frac{1000 \times 5 \times 2}{100} \right) = 100$$

$$C.I. [1000 \times \left(1 + \frac{5}{100} \right)^2 - 1000]$$

$$= [(1000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}) - 1000]$$

$$= \left(\frac{205}{2} \right) = 102.50$$

$$\text{अभीष्ट अंतर} = (102.50 - 100)$$

$$= 2.50$$

4. 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से $1\frac{1}{2}$ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो?

$$\text{हल} \rightarrow C.I. [6000 \times \left(1 + \frac{10}{100} \right) \times \left(1 + \frac{5}{100} \right) - 6000]$$

$$= (6000 \times \frac{110}{100} \times \frac{21}{20} - 6000)$$

$$= (6930 - 6000)$$

$$= 930 \text{ Ans}$$

5. किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है वह धनराशि कितनी है?

$$\text{हल} \rightarrow \text{माना मूलधन} = n, \text{ दर} = R\%$$

$$= \frac{n \times R \times 2}{100} = 900$$

$$= n \times R = \frac{900 \times 100}{2} = 45000$$

$$= [n \left(1 + \frac{R}{100} \right)^2 - n] = 954$$

$$= n \left(1 + \frac{R^2}{10,000} + \frac{2R}{100} \right) - n = 954$$

$$= \frac{nR \times R}{10,000} + \frac{nR}{50} = 954$$

$$= \frac{45000 \times R}{10,000} + \frac{45000}{50} = 954$$

$$= \frac{9R}{2} = (954 - 900) = 54$$

$$= R = \frac{54 \times 2}{9} = 12$$

$$\therefore n \times 12 = 45000$$

$$n = 3750 \text{ Ans}$$

6. 15494 रुपये को A तथा B में इस प्रकार बाँटे की 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष के अन्त में A का हिस्सा 11 वर्ष के अन्त में B के हिस्से के बराबर हो जाये तो A का हिस्सा है?

$$\text{हल} \rightarrow A \times \left(\frac{120}{100} \right)^9 = B \times \left(\frac{120}{100} \right)^{11}$$

$$= \frac{A}{B} = \frac{36}{25} = 36 : 25$$

$$= \frac{36}{61} \times 15494$$

$$= 9144$$

7. एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर धनराशि मिले यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा है?

हल →

बड़ा

:

छोटा

$$\frac{1}{120}$$

:

$$\frac{1}{130}$$

$$13$$

:

$$12$$

$$\frac{12}{25} \times 1,20,000$$

$$= 57,600$$

8. एक आदमी ने अपनी पूंजी का $\frac{1}{3}$ भाग 7% पर, $\frac{1}{4}$ भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया यदि उसकी वार्षिक आय 561 है तो पूंजी होगी?

$$\text{हल} \rightarrow \left(\frac{1}{\frac{1}{3} \times \frac{7}{100} + \frac{1}{4} \times \frac{8}{100} + \frac{5}{12} \times \frac{10}{100}} \right) \times 561$$

$$= 6600$$

258

9	145
10	180
11	167
12	163

वर्गीकृत आकड़ों का माध्य तीन विधियों से ज्ञात किया जाता है !

(a) प्रत्यक्ष विधि (Direct Method):-

$\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f}$ जहाँ $\sum fx$ चरों के उत्पाद तथा बारम्बारताओं के गुणनफल का योग $\sum f$ = बारम्बारताओं का योग !
गुणनफल का योग ! $\sum f$ = बारम्बारताओं का योग !
 $x = \frac{\text{ऊपरी वर्ग सीमा} + \text{निचली वर्ग सीमा}}{2}$

(b) कल्पित माध्य विधि (Assumed Mean Method):-

$\bar{x} = a + \frac{\sum fd}{\sum f}$ जहाँ a = (Assumed Mean):
 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ के लगभग बीच का मान $d = x - a$

कल्पित माध्य विधि तब प्रयोग में ली जाती है जब x और f के मान बड़े होते हो तो x और f का गुणनफल जटिल हो जाता है तथा इसमें समय अधिक लगता है !

(c) पग / पद विचलन विधि (Step Deviation Method):

पग विचलन विधि तभी सुविधाजनक होगी जबकि सभी d में कोई सर्व गुणखण्ड है ! इसमें विचलनों को समापवर्तक (वर्गमाप) h द्वारा विभाजित किया जाता है !

$x = a + h \left(\frac{\sum fu}{\sum f} \right)$ जहाँ $u = \frac{x-a}{h}$, (a = कल्पित माध्य) !

1. किसी स्कूल की कक्षा दस के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में से प्राप्त किये गये अंक नीचे सारणी में दिए गये हैं, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिये -

(a) प्रत्यक्ष विधि द्वारा

(b) कल्पित माध्य विधि द्वारा

(c) पद विचलन विधि द्वारा

प्राप्तांक	10-25	25-40	40-55	55-70	70-85	85-100
विद्यार्थियों की संख्या	2	3	7	6	6	6

हल :- (a) प्रत्यक्ष विधि : माध्य ($\bar{x}$) = $\frac{\sum fx}{\sum f}$

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या (f)	वर्ग चिह्न (x)	(fx)
10-25	2	17.5	35.0
25-40	3	32.5	97.5
40-55	7	47.5	332.5
55-70	6	62.5	375.0
70-85	6	77.5	465.0
85-100	6	92.5	555.0
प्राप्तांक	$\sum f$		$\sum fx = 1860$

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{1860}{30} = 62$$

(b) कल्पित माध्य : $\bar{x} = a + \frac{\sum fd}{\sum f}$

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या (f)	वर्ग चिह्न (x)	(a = 47.5), d = x-a	fd
10-25	2	17.5	-30	-60
25-40	3	32.5	-15	-45
40-55	7	47.5	0	0
55-70	6	62.5	15	90
70-85	6	77.5	30	180
85-100	6	92.5	45	270
योग	$\sum f = 30$			$\sum fd = 435$

$$\bar{x} = a + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

$$\text{या } \bar{x} = 47.5 + \frac{435}{30} = 47.5 + 14.5 = 62$$

(c) पद विचलन विधि : $x = a + h \left(\frac{\sum fu}{\sum f} \right)$

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या (f)	वर्ग चिह्न (x)	(a=47.5), d = x-a	$u = \frac{d}{h}$	fu
10-25	2	17.5	-30	-2	-4
25-40	3	32.5	-15	-1	-3
40-55	7	47.5	0	0	0

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -  **(Proof Video Link)**

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न, 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न, 150 में से)

UP Police Constable 2024 - <http://surl.li/rbfyn> (98 प्रश्न, 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKjl4nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gz2fJyt6vI>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp - <https://wa.link/we22vv> 1 web.- <https://shorturl.at/tD0Y8>

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.